



재외푸스가 된다

최근 동남아 등으로부터
세균성 이질 등 설사 감염병의
해외 유입 증가



질병관리본부

장티푸스란?

장티푸스는 감염에 의한 질환으로 인체 배설물이나
식수의 상태가 좋지 않은 개발도상국에서
지속적으로 유행하는 질환입니다.
평균 8~14일 정도의 잠복기를 지나
발열과 두통, 오한 등의 증상이 나타나며
흔히 어린 소아에게는 설사,
성인에게는 변비를 유발합니다

소아 - 설사 유발

성인 - 변비 유발



장티푸스는 어떻게 전파되나요?

■ 환자나 보균자의 소변이나 변으로 오염된 음식이나 물을 먹으면 감염이 되며
더러운 물이 섞인 해저에서 자란 갑각류나 어패류(특히 굴),
배설물이 묻은 과일 등을 통해 감염이 됩니다.



오염된 음식



오염된 해산물



오염된 과일



장티푸스를 예방하려면?

예.방.접.종 으로
예방 할 수 있습니다!

장티푸스 보균자와 밀접하게 접촉하는 사람(가족 등)과
장티푸스 유행지역으로 여행하는 사람,
장티푸스 균을 취급하는 실험실 요원은
반드시 **장티푸스 예방접종**을 맞아야 합니다!



※ 5세 이상 소아에서 1회 접종, 3년마다 추가접종 해야 합니다.



질병관리본부